

# INFECCIÓN URINARIA EN GESTANTES

Autores: Dra. Magdalena Ginard, Dra. Rosa Ruíz de Gopegui, Dra. Laia Vila


## **Bacteriuria asintomática:**

- Presencia de bacteriuria significativa en un cultivo de orina (definida como un crecimiento  $>100.000$  UFC/ml en orina recogida tras micción espontánea o  $>1.000$  UFC/ml en orina recogida por sondaje vesical), SIN que exista sintomatología clínica de infección urinaria.
- La bacteriuria asintomática durante el embarazo aumenta el riesgo de pielonefritis y se ha asociado con resultados adversos del embarazo, como parto prematuro y recién nacido de bajo peso. El tratamiento antimicrobiano reduce el riesgo de desarrollo posterior de pielonefritis y se asocia con mejores resultados en el embarazo, motivo por el que DEBE TRATARSE SIEMPRE en la población gestante. El manejo incluye terapia con antibióticos adaptada a los resultados del cultivo, así como un cultivo de seguimiento.


**Infección del tracto urinario (ITU):** presencia de un uropatógeno en el cultivo de orina, en ausencia de contaminación externa, asociando síntomas clínicos.

- Cistitis aguda: ITU que afecta exclusivamente a la vejiga.
- Pielonefritis aguda (PNA): ITU que afecta al parénquima renal.

## Bacteriuria asintomática



## Cistitis aguda



## Pielonefritis aguda

